

SORGO DE PASTOREO: RECOMENDACIONES DE MANEJO



Por ing. agrónomo
YAN PIERRE HERNANDEZ CONDE
3116715611-3175129978
INFO@CTOSEMILLAS.COM
CTOSEM SAS
www.ctosemillas.com

CTO COLON F



El sorgo de pastoreo directo es un híbrido con características de sudan, su alto contenido de proteína, en tallo y hojas, su azúcar en tallo, su alta capacidad de rebrote y macollamiento lo hacen ideal para aprovechar un pastoreo en zonas donde el suelo no es de mejor propiedad y donde el agua es escasa, lo convierte en una excelente alternativa de manejo.

Es un sorgo anual, y se puede utilizar como componente integral en la alimentación de ganado como aportante de fibra y proteínas.

Sus múltiples cortes y capacidad de aguantar el pisoteo lo hacen favorable para establecer un pastoreo, para aproximadamente un año y hasta año y medio.

Pero dentro de un manejo adecuado bien podemos hablar de 5 pastoreos.

el sorgo de pastoreo COLON F, se usa para terrenos donde las pasturas aportantes de proteína, suelen exigir mejores propiedades del suelo, agua y manejo.

El sorgo de pastoreo directo COLON F, se adapta muy bien a suelos secos áridos, de bajas propiedades de fertilidad. Y su principal aporte es proteína del 14%.

Se necesita desde 10 hasta 15 kilos para sembrar una hectárea,

1. PREPARACION DEL TERRENO

para sorgo de pastoreo se hace una preparación a 25 cm con rastras medianas.

se procede a realizar correctivos necesarios, cal o enmiendas y materia orgánica al suelo. se incorporan con la misma rastra. si lo desea podría realizar la primera abonada al boleo con dos bultos de Dap.

2. SIEMBRA.

LOS METODOS DE SIEMBRA SON AL BOLEO, A CHUZO O CON SEMBRADORAS.

SIEMBRA AL BOLEO:

se realiza de manera manual calculando entre 30 y 60 plantas por metro cuadrado o sea de 1 a 1,5 gramos por metro cuadrado.

SIEMBRA A CHUZO:

se realiza haciendo un chuzón muy superficial en la tierra cada 30 cm en zigzag o en surcos, sembrando unas 5 semillas por sitio, lo más importante es no profundizar demasiado la semilla máximo 2 cm,

SIEMBRA CON MAQUINA:

Se puede realizar con sembradoras de grano fino y a chorrillo, separando cada a 30 cm y hasta 50 cm, realizando un chorrillo denso, de aproximadamente 0.45 gramos por metro lineal a 30 cm de surco y 0.75 a 50 cm de surco.

Si desea tratar la semilla con Tiamethoxam, usar las dosis De la etiqueta normalmente recomendadas para maíz, al 50% de las recomendaciones para maíz.

SORGO DE PASTOREO: RECOMENDACIONES DE MANEJO



Por ing. agrónomo
YAN PIERRE HERNANDEZ CONDE
3116715611-3175129978
INFO@CTOSEMILLAS.COM
CTOSEM SAS
www.ctosemillas.com

CTO COLON F

También puede controlar en preemergencia las malezas con ATRAZINA 2 KILOS POR HA. ó, pendimetalina posemrgente al sorgo(2 litros por ha)

3. FERTILIZACION:

Se realiza previo a la siembra con dos bultos de Dap por ha, y posteriormente un abono completo trile 18 o triple 15 al boleo de uno a dos bultos por ha a los 15 días de establecido, y cada que retire el ganado lo podrá realizar un bulto a dos por ha al boleo.

INGRESO DEL GANADO:

El ingreso del ganado se podrá realizar cuando el sorgo tenga una altura de entre 50 cm y 1, 20, lo mas recomendado para asegurar una buena cantidad de materia seca por ha y alta carga animal es a los 70 cm, así asegura un numero de rebrotes mayores. En zonas de 0 a 1000 msnm esta se da normalmente desde los 45 días y hasta los 55 días.

Se recomienda incrementar la carga del lote a la mayor cantidad de animales posible, ya que empieza a florecer aproximadamente a los 65 días. (entre 4 a 5 animales por ha de carga de 300 a 500 kg de peso)



SORGO DE PASTOREO: RECOMENDACIONES DE MANEJO



Por ing. agrónomo
YAN PIERRE HERNANDEZ CONDE
3116715611-3175129978
INFO@CTOSEMILLAS.COM
CTOSEM SAS
www.ctosemillas.com

CTO COLON F

RETIRO DEL GANADO:

El ganado normalmente se retira al bajarlo a los 20 cm de altura.



CUIDADOS: SE DEBE TENER SAL DE AZUFRE CERCA DEL LOTE PARA QUE EL ANIMAL LO ESTE CONSUMIENDO.

NO INGRESAR EL ANIMAL CUANDO EL SORGO RECIÉN ESTÉ REBROTANDO DE MANERA VIGOROSA, Y LOS ANIMALES HAMBRIADOS, EN TODOS LOS CASOS, SE DEBEN INGRESAR CUANDO YA HAYA SUPERADO LOS 70 CM DE ALTURA.

EL SORGO PUEDE DURAR MAS DE 5 PASTOREOS. SI ES BIEN MANEJADO.

SU USO ES, EN COMPONENTE ACTIVO DE UN MANEJO ADECUADO PARA APORTE DE PROTEINA, PUEDE DAR MAS DE 5000 KG DE MTS POR HA POR PASTOREO.

YAN PIERRE HERNANDEZ CONDE
Ing. agrónomo
CC 16766368
TP 76209180839VLL
CEL 311 6715611-3175129978
COREO INFO@CTOSEMILLAS.COM
www.ctosemillas.com